

Przygotowanie do gastroskopii

W dniu badania jeżeli odbywa się w godzinach przedpołudniowych, chory zgłasza się na czczo (nie pije i nie je). Jeżeli badanie odbywa się w godzinach popołudniowych, pozostaje na czczo tj. 4 godziny bez picia i 6 godzin bez jedzenia.

Choroby przewlekłe.

W przypadku podawania leków istotnych dla zdrowia - nasercowych, p/nadciśnieniowych, antyrytmicznych, tarczycowych, przeciwdrgawkowych, przeciwastmatycznych - może je przyjąć popijając niewielką ilością płynu - niegazowanej wody - na 1-2 godziny przed badaniem.

W przypadku przyjmowania leków p/cukrzycowych, jeżeli badanie odbywa się w godzinach przedpołudniowych nie przyjmuje np: insuliny, doustnych leków p/cukrzycowych; ale przynosi je ze sobą łącznie ze śniadaniem - będzie je mógł użyć ok. 20 minut po badaniu.

Jeżeli badanie odbywa się w godzinach popołudniowych badany może przyjąć leki p/cukrzycowe i spożyć śniadanie a następnie pozostać na czczo do czasu badania.

Przewlekłe leczenie p/zakrzepowe doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi (Sintrom, Acenocumarol, Worfin) nie jest przeciw wskazaniem do endoskopowego badania diagnostycznego (gastroskopia, kolonoskopia). Pacjent winien jedynie okazać aktualny wynik INR zawierający się pomiędzy 2-3.

Nie ma przeciwwskazań do badania podczas iniekcji podskórnych z heparyn drobnocząsteczkowych - Fraxiparine, Clexane, Fraxodi.

W sytuacjach wątpliwych wskazana jest konsultacja z lekarzem.